Des petits problèmes

exercices

1000**Équation fonctionnelle et dérivabilité en 0**

Soit f une fonction continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et dérivable en 0. On suppose que

$$\star \quad \forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = \frac{2f(x)}{1 + (f(x))^2}.$$

1. Montrer que $f(0) \in \{0, 1, -1\}$ et $\forall t \in \mathbb{R}, f(t) \in [-1, 1]$.
2. Dans cette question, on suppose que $f(0) = 1$ et on veut montrer que $f = 1$.
Pour cela, on fixe $a \in \mathbb{R}^*$ et on pose $u_n = f\left(\frac{a}{2^n}\right)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Étudier la limite, le signe et la monotonie de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. En déduire que $f(a) = 1$.
3. On suppose que $f(0) = -1$. Que peut-on en déduire ?

Remarquer que $-f$ vérifie $\star$.

4. Dans cette question, on suppose que $f(0) = 0$.
 - (4a) Montrer que $\forall t \in \mathbb{R}, f(t) \in]-1, 1[$.
 - (4b) Déterminer le domaine de définition de $y \mapsto \ln\left(\frac{1-y}{1+y}\right)$.

Dans la suite, on pose

$$g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ t \longmapsto \ln\left(\frac{1-f(t)}{1+f(t)}\right)$$

- (4c) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, g(2x) = 2g(x)$.
- (4d) Montrer qu'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{g(u)}{u} \xrightarrow{u \rightarrow 0} \ell$.
- (4e) Soit $a \in \mathbb{R}$. En considérant la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = 2^n g\left(\frac{a}{2^n}\right),$$

montrer que $g(a) = \ell a$ et exprimer $f(a)$ en fonction de ℓ et de a .

1001**Équation fonctionnelle et continuité**

On pose $\mathcal{E}$ l'ensemble des fonctions f continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant

$$\star \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$$

1. Déterminer les fonctions constantes de $\mathcal{E}$.

Dans les questions suivantes, on désigne par f une fonction non constante de l'ensemble $\mathcal{E}$.

2. Montrer que $f(0) = 1$ et que f est paire.
3. Montrer qu'il existe $h > 0$ tel que $\forall x \in [-h, h], f(x) \geq 0$.
4. Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{1}{2^{n_0}} \leq h$.

On suppose que $f\left(\frac{1}{2^{n_0}}\right) \leq 1$.

$$(4a) \text{ Montrer qu'il existe } a \in \mathbb{R} \text{ tel que } f\left(\frac{1}{2^{n_0}}\right) = \cos\left(\frac{a}{2^{n_0}}\right) \text{ et } \frac{a}{2^{n_0}} \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

$$(4b) \text{ Montrer que } \forall n \geq n_0, f\left(\frac{1}{2^n}\right) = \cos\left(\frac{a}{2^n}\right).$$

$$(4c) \text{ Montrer que } \forall n \geq n_0, \forall p \in \mathbb{Z}, f\left(\frac{p}{2^n}\right) = \cos\left(a \frac{p}{2^n}\right).$$

$$(4d) \text{ On considère } Y = \left\{ y \in \mathbb{R} \mid \exists (p, n) \in \mathbb{Z} \times \llbracket n_0, +\infty \llbracket, y = \frac{p}{2^n} \right\}.$$

Pour la culture, Y est un sous-ensemble des nombres dyadiques.

(i) Que peut-on dire de f restreinte à Y ?

(ii) Montrer que tout réel $x \in \mathbb{R}$ est la limite d'une suite $(y_m)_{m \in \mathbb{N}}$ d'éléments de Y .

On dit que Y est une partie dense de $\mathbb{R}$.

- (4e) En déduire l'expression de $f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
5. Sans vouloir écrire tous les détails, expliquer comment traiter le cas $f\left(\frac{1}{2^{n_0}}\right) > 1$.
On pourra commencer par justifier l'existence de $a \in \mathbb{R}$ tel que $f\left(\frac{1}{2^{n_0}}\right) = \operatorname{ch}\left(\frac{a}{2^{n_0}}\right)$.
A-t-on besoin d'ajouter une condition sur $\frac{a}{2^{n_0}}$ comme précédemment ?
6. Déterminer $\mathcal{E}$.

1. Dans $\star$, prenons $x = 0$.

En posant $y = f(0)$, on obtient

$$y = \frac{2y}{1+y^2} \quad \text{donc} \quad y(1+y^2) - 2y = 0.$$

D'où $y \in \{-1, 0, 1\}$.

Soit $t \in \mathbb{R}$. Montrons que $|f(t)| \leq 1$.

Dans $\star$, prenons $x = \frac{t}{2}$. En posant $a = f(\frac{t}{2})$, on obtient :

$$f(t) = \frac{2a}{1+a^2} \quad \text{d'où} \quad |f(t)| = \frac{2|a|}{1+a^2}$$

L'inégalité à montrer $|f(t)| \leq 1$ est équivalente à $2|a| \leq 1+a^2$, car $1+a^2 > 0$. Et cette dernière inégalité est équivalente à $(1-|a|)^2 \geq 0$, qui est vérifiée!

2. — Étude de la limite.

On a $\frac{a}{2^n} \rightarrow 0$ et f continue en 0 donc $u_n \rightarrow f(0) = 1$.

— Étude du signe. Montrons que la suite u est strictement positive.

Dans $\star$, prenons $x = \frac{a}{2^{n+1}}$, on obtient

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \frac{2u_{n+1}}{1+u_{n+1}^2}$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, les réels u_n et u_{n+1} ont le même signe.

Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $u_{n_0} \leq 0$.

Alors par une récurrence immédiate, on obtiendrait

$$\forall n \geq n_0, \quad u_n \leq 0.$$

Puis par passage à la limite, on obtiendrait $1 \leq 0$, ce qui est absurde.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$.

— Étude de la monotonie.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{2}{1+u_{n+1}^2}$$

D'après la première question, on a $u_{n+1} \in [-1, 1]$, donc $u_{n+1}^2 \leq 1$, donc $\frac{2}{1+u_{n+1}^2} \geq 1$.

En multipliant par $u_n \geq 0$, on obtient

$$u_n \geq u_{n+1}.$$

Donc la suite (u_n) est décroissante.

— Récoltons toutes les informations. On a :

$$\begin{cases} (u_n) \text{ converge vers } 1 \\ (u_n) \text{ est à valeurs dans } [-1, 1] \\ (u_n) \text{ est décroissante} \end{cases}$$

Il ne doit pas être difficile de montrer que (u_n) est constante égale à 1! Pour cela, il suffit d'écrire, que pour n fixé, on a

$$\forall p \geq n, \quad u_p \leq u_n \leq 1$$

Et en passant à la limite sur p (licite), on obtient $1 \leq u_n \leq 1$ d'où $u_n = 1$.

Bref, la suite (u_n) est constante égale à 1, donc $u_0 = 1$, donc $f(a) = 1$.

3. L'hypothèse $f(0) = -1$ s'écrit $(-f)(0) = 1$.

On est donc ramené à la question précédente pourvu que l'on arrive à montrer que $-f$ satisfait les mêmes conditions que f .

Tout d'abord, la fonction $-f$ est continue et dérivable en 0 (par héritage), et comme f vérifie $\star$, on a

$$-f(2x) = \frac{-2f(x)}{1+(-f(x))^2} \quad \text{d'où} \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad (-f)(2x) = \frac{2(-f)(x)}{1+((-f)(x))^2}$$

Bilan : on en déduit que $-f$ est constante égale à 1, donc f est constante égale à -1 .

4. (4a) Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on rappelle que $f(t) \in [-1, 1]$.
 Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $f(a) \in \{-1, 1\}$.
 Définissons une suite (u_n) comme précédemment par $u_n = f\left(\frac{a}{2^n}\right)$.

Montrons ensuite par récurrence

$$\diamond \quad \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| = 1$$

- Initialisation. On a $u_0 = f(a)$, donc $|u_0| = 1$.
- Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $|u_n| = 1$. On a

$$u_n = \frac{2u_{n+1}}{1 + u_{n+1}^2} \quad \text{donc} \quad |u_n| = \left| \frac{2u_{n+1}}{1 + u_{n+1}^2} \right| \quad \text{donc} \quad 1 = \frac{2|u_{n+1}|}{1 + u_{n+1}^2}$$

Donc $(|u_{n+1}| - 1)^2 = 0$, d'où $|u_{n+1}| = 1$, ce qui clôt la récurrence.

Par le même argument qu'à la question précédente, on obtient $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f(0) = 0$.

Donc par passage à la limite dans $\diamond$ (on utilise la continuité de la fonction valeur absolue en 0), on obtient $|0| = 1$, ce qui est absurde.

Donc $\forall t \in \mathbb{R}, f(t) \in]-1, 1[$.

- (4b) Soit $y \in \mathbb{R}$. La fonction est définie en y si et seulement si $\begin{cases} 1 + y \neq 0 \\ \frac{1 - y}{1 + y} > 0 \end{cases}$

En réalisant un tableau de signes, on obtient que le système équivaut à $y \in]-1, 1[$.

Cela légitime la définition de la fonction g .

- (4c) Soit $x \in \mathbb{R}$. On a

$$g(2x) = \ln \left(\frac{1 - \frac{2f(x)}{1+f(x)^2}}{1 + \frac{2f(x)}{1+f(x)^2}} \right) = \ln \left(\frac{(1 - f(x))^2}{(1 + f(x))^2} \right) = 2g(x)$$

- (4d) On sait que :

- la fonction f est dérivable en 0 et $f(0) = 0$
- la fonction $y \mapsto \ln\left(\frac{1-y}{1+y}\right)$ est dérivable en 0. WHY ?

Donc la fonction g qui est la composée de ces deux fonctions est dérivable en 0.

Ainsi, $\frac{g(u)}{u} = \frac{g(u) - g(0)}{u - 0}$ admet une limite finie quand $u \rightarrow 0$

- (4e) • Pour commencer, notons que

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = 2^n g\left(\frac{2a}{2^{n+1}}\right) = 2^{n+1} g\left(\frac{a}{2^{n+1}}\right) = v_{n+1}.$$

Ainsi, la suite (v_n) est constante égale à $v_0 = g(a)$.

- Montrons maintenant que $g(a) = \ell a$.

Si $a = 0$ c'est évident.

Supposons donc que $a \neq 0$. On a

$$\diamond \quad \forall n \in \mathbb{N}, v_n = a \times \frac{g\left(\frac{a}{2^n}\right)}{\frac{a}{2^n}}$$

On a

$$\begin{cases} \frac{a}{2^n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0 \\ \frac{g(u)}{u} \xrightarrow[u \rightarrow 0]{} \ell \end{cases} \quad \text{donc} \quad \frac{g\left(\frac{a}{2^n}\right)}{\frac{a}{2^n}} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell.$$

En passant à la limite dans $\diamond$, on obtient $g(a) = \ell a$.

- Pour finir. Comme $g(a) = \ell a$, on obtient

$$\frac{1 - f(a)}{1 + f(a)} = e^{\ell a} \quad \text{donc} \quad 1 - f(a) = e^{\ell a} + e^{\ell a} f(a) \quad \text{donc} \quad \underbrace{(1 + e^{\ell a})}_{>0} f(a) = 1 - e^{\ell a}.$$

Finalement, on a $f(a) = \frac{1 - e^{\ell a}}{1 + e^{\ell a}}$.

1. Soit $f \in \mathcal{E}$ que l'on suppose constante égale à C .
Avec la relation $\star$, on a $C + C = 2C \times C$ donc $C = 0$ ou $C = 1$.
Réciproquement, les fonctions constantes égales à 0 et à 1 sont continues et vérifient $\star$.
2. • En prenant $x = y = 0$ dans $\star$, on obtient $f(0) = 0$ ou 1.
Supposons par l'absurde que $f(0) = 0$.
D'après $\star$ avec $y = 0$, on obtient alors $\forall x \in \mathbb{R}, 2f(x) = 0$.
Donc f est constante égale à 0 ce qui n'est pas le cas.
Donc $f(0) = 1$.
• Prenons $\star$ avec $x = 0$. On obtient $\forall y \in \mathbb{R}, f(y) + f(-y) = 2f(y)$ donc $f(y) = f(-y)$.
Ainsi, f est paire.
3. Comme f est continue en 0, il existe $h > 0$ tel que $\forall x \in [-h, h], |f(x) - f(0)| \leq \frac{1}{2}$.
Or $f(0) = 1$. Donc pour tout $x \in [-h, h]$, on a $-\frac{1}{2} + 1 \leq f(x)$ donc $f(x) \geq 0$.
4. Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{1}{2^{n_0}} \leq h$. On suppose que $f\left(\frac{1}{2^{n_0}}\right) \leq 1$

$$(4a) \text{ On a } f\left(\frac{1}{2^{n_0}}\right) \in [0, 1].$$

Posons $a = 2^{n_0} \operatorname{Arccos}\left(f\left(\frac{1}{2^{n_0}}\right)\right)$ (licite car la fonction Arccos est définie sur $[-1, 1]$).

$$\star \text{ On a } \cos\left(\frac{a}{2^{n_0}}\right) = f\left(\frac{1}{2^{n_0}}\right)$$

$$\star \text{ On a } \frac{a}{2^{n_0}} \in [0, \frac{\pi}{2}] \text{ car pour tout } t \in [0, 1], \text{ on a } \operatorname{Arccos} t \in [0, \frac{\pi}{2}].$$

Donc ce candidat pour a convient.

(4b) Avec $y = x$ dans $\star$, on obtient

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) + 1 = 2f(x)^2$$

D'où

$$\forall n \in \mathbb{N}, f\left(\frac{1}{2^n}\right) + 1 = 2f\left(\frac{1}{2^{n+1}}\right)^2.$$

Montrons par récurrence

$$\forall n \geq n_0, f\left(\frac{1}{2^n}\right) = \cos\left(\frac{a}{2^n}\right)$$

Initialisation.

La propriété est évidente pour $n = n_0$, par définition de a .

Hérédité. Soit $n \geq n_0$ tel que $\mathcal{H}_n$.

D'après la remarque précédente, on a

$$f\left(\frac{1}{2^n}\right) + 1 = 2f\left(\frac{1}{2^{n+1}}\right)^2.$$

D'après $\mathcal{H}_n$, on a donc

$$\cos\left(\frac{a}{2^n}\right) + 1 = 2f\left(\frac{1}{2^{n+1}}\right)^2.$$

Or $1 + \cos u = 2 \cos^2\left(\frac{u}{2}\right)$, d'où

$$2 \cos^2\left(\frac{a}{2^{n+1}}\right) = 2f\left(\frac{1}{2^{n+1}}\right)^2.$$

Ainsi (attention au « plus ou moins 1 ») :

$$\cos\left(\frac{a}{2^{n+1}}\right) = \pm f\left(\frac{1}{2^{n+1}}\right)$$

Comme $0 \leq \frac{1}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{2^{n_0}} \leq h$, on a $f\left(\frac{1}{2^{n+1}}\right) \geq 0$

Comme $0 \leq \frac{a}{2^{n+1}} \leq \frac{a}{2^{n_0}} \leq \frac{\pi}{2}$, on a $\cos\left(\frac{a}{2^{n+1}}\right) \geq 0$.

D'où $\cos\left(\frac{a}{2^{n+1}}\right) = f\left(\frac{1}{2^{n+1}}\right)$.

D'où $\mathcal{H}_{n+1}$.

(4c) On fixe $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq n_0$.

Montrons

$$\forall p \in \mathbb{Z}, \quad f\left(\frac{p}{2^n}\right) = \cos\left(a\frac{p}{2^n}\right)$$

• Commençons par le cas $p \in \mathbb{N}$. Le cas $p = 0$ est immédiat. Procédons par récurrence forte, et notons pour tout $p \in \mathbb{N}^*$,

$$\mathcal{H}_p : \left\langle f\left(\frac{p}{2^n}\right) = \cos\left(a\frac{p}{2^n}\right) \right\rangle.$$

— La question précédente fournit $\mathcal{H}_1$.

— Soit $p \geq 1$ tel que $\mathcal{H}_0, \dots, \mathcal{H}_p$.

Montrons $\mathcal{H}_{p+1}$.

En prenant $x = \frac{p}{2^n}$ et $y = \frac{1}{2^n}$, il vient

$$f\left(\frac{p+1}{2^n}\right) + f\left(\frac{p-1}{2^n}\right) = 2f\left(\frac{p}{2^n}\right)f\left(\frac{1}{2^n}\right)$$

En utilisant la relation de la question (4b), on a

$$f\left(\frac{p+1}{2^n}\right) + f\left(\frac{p-1}{2^n}\right) = 2f\left(\frac{p}{2^n}\right)\cos\left(\frac{a}{2^n}\right)$$

D'après $\mathcal{H}_p$ et $\mathcal{H}_{p-1}$, on a $f\left(\frac{p}{2^n}\right) = \cos\left(a\frac{p}{2^n}\right)$ et $f\left(\frac{p-1}{2^n}\right) = \cos\left(a\frac{p-1}{2^n}\right)$.

On remplace, il vient

$$f\left(\frac{p+1}{2^n}\right) = 2\cos\left(a\frac{p}{2^n}\right)\cos\left(\frac{a}{2^n}\right) - \cos\left(a\frac{p-1}{2^n}\right)$$

et on termine avec la formule de trigonométrie suivante :

$$2\cos(u)\cos(v) = \cos(u+v) + \cos(u-v)$$

D'où

$$f\left(\frac{p+1}{2^n}\right) = \cos\left(a\frac{p+1}{2^n}\right)$$

• On étend ensuite ce résultat à $p \in \mathbb{Z}$ grâce à la parité de f et de $\cos$.

(4d) On considère $Y = \left\{ y \in \mathbb{R} \mid \exists (p, n) \in \mathbb{Z} \times \llbracket n_0, +\infty \llbracket, y = \frac{p}{2^n} \right\}$.

Pour la culture, Y est un sous-ensemble des nombres dyadiques.

(i) Que peut-on dire de f restreinte à Y ?

D'après la question précédente, on a montré que

$$\forall y \in Y, \quad f(y) = \cos(ay)$$

Ainsi, f et $x \mapsto \cos(ax)$ coïncident sur Y .

(ii) Montrer que tout réel est la limite d'une suite $(y_m)_{m \in \mathbb{N}}$ d'éléments de Y .

Soit $x \in \mathbb{R}$.

On considère la suite $(y_m)_{m \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall m \in \mathbb{N}, \quad y_m = \frac{\lfloor 2^{m+n_0}x \rfloor}{2^{m+n_0}}$$

Par construction, la suite $(y_m)_{m \in \mathbb{N}}$ est à valeurs dans Y .

De plus, comme $\lfloor t \rfloor \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} t$, on a $\lfloor 2^{m+n_0}x \rfloor \underset{m \rightarrow +\infty}{\sim} 2^{m+n_0}x$.

D'où $y_m \underset{m \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2^{m+n_0}x}{2^{m+n_0}} = x$. Autrement dit, $y_m \rightarrow x$.

(4e) Montrons que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \cos(ax)$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Il existe une suite $(y_m) \in Y^{\mathbb{N}}$ telle que $y_m \rightarrow x$.

Or f et $x \mapsto \cos(ax)$ coïncident sur Y , donc :

$$\diamond \quad \forall m \in \mathbb{N}, \quad f(y_m) = \cos(ay_m)$$

On a $y_m \rightarrow x$ et f continue en x , d'où $f(y_m) \rightarrow f(x)$.

On a $ay_m \rightarrow ax$ et $\cos$ continue en ax , d'où $\cos(ay_m) \rightarrow \cos(ax)$.

Par passage à la limite dans $\diamond$, on a $f(x) = \cos(ax)$.

5. On procède exactement de la même façon.

On introduit a tel que $f\left(\frac{1}{2^{n_0}}\right) = \operatorname{ch}\left(\frac{a}{2^{n_0}}\right)$.

L'existence d'un tel a provient du fait que $f\left(\frac{1}{2^{n_0}}\right) \geq 1$ et la fonction ch a pour image $[1, +\infty[$.

Donc il existe $b \in \mathbb{R}$ tel que $\operatorname{ch}(b) = f\left(\frac{1}{2^{n_0}}\right)$. Il n'y a plus qu'à poser $a = 2^{n_0}b$.

Remarque : un tel b n'est pas nécessairement unique ; il devient unique si on impose $b \in [0, +\infty[$ ou si on impose $b \in]-\infty, 0]$.

On n'a pas besoin d'imposer une condition sur $\frac{a}{2^{n_0}}$, car cette condition était là pour forcer la positivité de $\cos\left(\frac{a}{2^n}\right)$. Ici, la positivité de $\operatorname{ch}\left(\frac{a}{2^n}\right)$ est automatique (puisque ch est à valeurs dans $[1, +\infty[$) !

On a précédemment utilisé les deux formules de trigonométrie circulaire

$$1 + \cos u = 2 \cos^2\left(\frac{u}{2}\right) \quad \text{et} \quad 2 \cos(u) \cos(v) = \cos(u+v) + \cos(u-v)$$

Comme on a les pendants en trigonométrie hyperbolique :

$$1 + \operatorname{ch} u = 2 \operatorname{ch}^2\left(\frac{u}{2}\right) \quad \text{et} \quad 2 \operatorname{ch}(u) \operatorname{ch}(v) = \operatorname{ch}(u+v) + \operatorname{ch}(u-v)$$

tout s'adapte à merveille !

Et on montre dans ce cas (celui pour lequel $f\left(\frac{1}{2^{n_0}}\right) \geq 1$) que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $f(x) = \operatorname{ch}(ax)$.

Remarque. On a même pu prendre une inégalité large dans $f\left(\frac{1}{2^{n_0}}\right) \geq 1$, alors que l'énoncé signale $f\left(\frac{1}{2^{n_0}}\right) > 1$. On pourrait trouver cela étonnant que dans le cas d'égalité $f\left(\frac{1}{2^{n_0}}\right) = 1$, on obtient que f est à la fois de la forme $x \mapsto \cos(a'x)$ et $x \mapsto \operatorname{ch}(a''x)$.

Mais ce n'est pas contradictoire, car dans ce cas d'égalité, on trouve d'une part $a' = 0$ de sorte que $f : x \mapsto 1$; et on trouve d'autre part $a'' = 0$ de sorte que $f : x \mapsto 1$.

Bref, lorsque $f\left(\frac{1}{2^{n_0}}\right) = 1$, on trouve que f est constante égale à 1.

6. Nous venons de rédiger la phase d'Analyse. Autrement dit, nous avons montré que $\mathcal{E}$ est inclus dans l'ensemble $\mathcal{F}$ constitué des fonctions de la forme $x \mapsto \cos(ax)$ avec $a \in \mathbb{R}$, et $x \mapsto \operatorname{ch}(ax)$ avec $a \in \mathbb{R}$ et de la fonction nulle.

L'autre inclusion (qui constitue la phase de Synthèse) est facile à vérifier avec quelques calculs. Il ne faut pas oublier de préciser que toutes ces fonctions sont bien continues (ce sont des fonctions usuelles !).